



Groupe Chiroptères d'Indre et Loire

Sérotine commune *Eptesicus serotinus*



Directive Habitats Faune Flore : Annexe IV
Protection Nationale (Arrêté du 23 avril 2007)
Liste rouge Française : Préoccupation mineure
Liste rouge régionale : Préoccupation mineure

Description

La Sérotine commune est une grande chauve souris robuste mesurant 8 cm pour une envergure de 35 cm. Son museau est sombre et ses oreilles triangulaires sont arrondies à leurs sommets. Son pelage de couleur variable tire vers le brun foncé. C'est une chauve souris très timide qui disparaît le plus souvent très rapidement en cas d'intrusion dans le gîte.

Ecologie :

La Sérotine commune fréquente un très grand nombre de milieu avec une préférence pour les milieux ouverts (le bocage, les prairies, les lisières, les parcs, les jardins, les zones humides...). Cette chauve souris chasse aussi bien à hauteur de végétation qu'en rase motte. La Sérotine commune attrape tout ce qui lui passe sous le museau : papillons, mouches, moustiques, éphémères mais on distingue une légère préférence pour les coléoptères, principalement les Hannetons.

Hibernation


Cette chauve souris peut être retrouvée en hibernation dans différents endroits : greniers, toitures, églises, caves...

Reproduction

Les femelles de cette espèce semblent apprécier les combles vastes où elles peuvent facilement disparaître dans la charpente.

Conservation

La Sérotine commune est une espèce que l'on retrouve dans chaque région de France. En Indre et Loire, de nombreux enregistrements ont confirmé sa présence. Des études approfondies devraient nous permettre de connaître plus précisément la répartition et les effectifs de cette espèce au sein du département.



Source : Les chauves souris France, Belgique, Luxembourg et Suisse, Laurent ARTHUR et Michèle LEMAIRE